

## Забір крові

- Кров на дослідження необхідно здавати тільки натще.
- Напередодні здачі венозної крові для досліджень не можна вживати жирну їжу.

### Слід пам'ятати:

- на результати лабораторних досліджень можуть впливати лікарські препарати, а також лікувальні та діагностичні процедури;
- результати лабораторного аналізу будь-якої складності не є діагнозом і потребують консультації спеціаліста.

## Забір сечі

- Сечу збирають у спеціальний контейнер призначений для збору сечі, яку можна отримати у медичному центрі.
- Сечу необхідно доставити до 1 год після забору.
- Не рекомендується збирати сечу під час місячних і впродовж 5–7 днів після цистоскопії. За необхідності рекомендуємо користуватись тампоном, щоб унеможливити потрапляння крові в аналіз.
- Не рекомендується збирати сечу під час прийому лікарських засобів. Якщо в іншу пору це неможливо зробити, повідомте про це лікаря.

### Загальний аналіз сечі

- Перед забором провести гігієнічний туалет зовнішніх статевих органів.
- Слід збирати тільки вранішню порцію сечі одразу після сну в спеціальний контейнер призначений для забору сечі, об'ємом до 100 мл.

### Аналіз сечі за методом Нечипоренка

- Перед забором провести гігієнічний туалет зовнішніх статевих органів.
- Для аналізу необхідно зібрати середню порцію первинної ранкової сечі в спеціальний контейнер призначений для забору сечі, об'ємом до 100 мл.

## Забір калу

### Аналіз калу на копрограму, яйця гельмінтів, лямблії

- Кал збирають у спеціальний контейнер який можна отримати у медичному центрі.
- Перед забором необхідно спочатку провести гігієнічний туалет зовнішніх статевих органів, а потім – помочитися. Дефекацію здійснюють у суху чисту посудину. Пробу калу із різних місць разової порції перенести в контейнер за допомогою ложечки, вмонтованої в кришку (не більше ніж 1/3 об'єму контейнера).
- Бажано проводити забір калу вранці та доставляти матеріал у лабораторію протягом 1 год, щоб у ньому під дією ферментів та мікроорганізмів не відбулися зміни. Якщо це неможливо, пробу збирають раніше, але не швидше ніж за 8 год до здачі в лабораторію.

- Забезпечити відсутність у зразку сечі та води.
- Після забору слід закрутити кришку на контейнері та написати своє прізвище, ім'я, по батькові (повністю).
- Не рекомендовано проводити дослідження калу раніше ніж через 2 дні після клізми, рентгенологічного обстеження, колоноскопії.

### **КІЛЬКІСТЬ ЄМНОСТЕЙ МАЄ ВІДПОВІДАТИ КІЛЬКОСТІ ОБСТЕЖЕНЬ**

#### **Забір калу на дисбактеріоз**

- Зразки вранішнього калу необхідно зібрати у стерильний посуд, як описано вище.
- Доставляти матеріал у лабораторію бажано якнайшвидше, оскільки він не підлягає зберіганню.

#### **Не рекомендовано:**

- напередодні приймати проносні препарати, активоване вугілля, препарати заліза, міді;
- вісмуту, використовувати ректальні свічки;
- проводити дослідження калу в жінок під час місячних.



#### **Графік роботи контакт-центру:**

**Пн.– Пт.: 07:00–22:00 Сб.: 08:00–21:00 Нд.: 08:00–20:00**

#### **Попередній запис:**

**+38 (032) 295-4-000, +38 (095) 295-4-000, +38 (067) 295-4-000, +38 (063) 295-4-000**

*Згідно з тарифними планами оператора*

**[www.medcenter.lviv.ua](http://www.medcenter.lviv.ua)**

*Текстові матеріали, фотографії та рисунки є інтелектуальною власністю Медичного центру Святої Параскеви*

Ліцензія МОЗ України АЕ №197581 від 18.04.2013

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ  
ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я